

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	RTW Fahrzeug	NEF Fahrzeug	Rucksack RTW/NEF	NEF Tox-Box	Kinder-rucksack
Akrinor®	1 Ampulle zu 2ml enthält 200mg Cafedrin-HCl und 10mg Theodrenalin-HCl	β-Sympathomimetikum mit antihypotoner Wirkung	1	-	1	-	-
Anticholium®	1 Ampulle zu 5ml enthält 2mg Physostigminsalicilat	Antidot vs Psychopharmaka + Antihistamin-Intoxikation	-	-	-	1	-
Aspirin® i.V. 500mg Pulver und Lösungsmittel	1 Durchstechflasche enthält 0,5g Trockensubstanz Acetylsalicylsäure	Analgetika, Thrombozytenaggregationshemmer	3	-	1	-	-
Atropinsulfat-100mg	1 Ampulle zu 10ml enthält 100mg Atropinsulfat	Antidot vs Organophosphate	-	-	-	5	-
Atropinum sulfuricum	1 Ampulle zu 1ml enthält 1 mg Atropinsulfat	Spasmolytika, Anticholinergika	3	-	3	-	-
Atrovent® 250 µg Fertiginhalat	1 Fertiginhalat zu 2ml enthält 250 µg Ipratropiumbromid	Anticholinergikum	2	-	2	-	2
Bayotensin® akut	1 Phiole mit 1ml Lösung enthält 5mg Nitrendipin	Calciumantagonist, Antihypertonika	2	-	2	-	-
Berotec® N 100 µg Dosier-Aerosol	1 Aerosolstoß enthält 100 µg Fenoterol-HBr	β <sub>2</sub> -Sympathomimetikum	1	-	1	-	-
Bronchospasmin®	1 Ampulle zu 1ml enthält 0,09mg Reproterol-HCl	β <sub>2</sub> -Sympathomimetikum	3	-	2	-	-
BS-ratiopharm®	1 Ampulle zu 1ml enthält 20mg Butylscopolaminiumbromid	Spasmolytika, Anticholinergika	2	-	1	-	-
Calciumgluconat 10% B. Braun	1 Ampulle zu 10ml enthält 940mg Calciumgluconat	Antidota vs Flusssäure	-	-	-	2	-
Clexane 40mg Klinik	1 Ampulle zu 0,4 ml enthält 40mg Enoxaparin-Natrium	Antikoagulans	1	-	1	-	-

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	RTW Schrank	NEF	Rucksack RTW/NEF	NEF Tox-Box	Kinder-rucksack
Cordarex®	1 Ampulle zu 3ml enthält 150mg Amiodaron-HCl	Antiarrhythmika	3	-	3	-	-
Diazepam-ratiopharm®	1 Ampulle zu 2ml enthält 10mg Diazepam	Benzodiazepin	2	-	2	-	-
Diazepam Desitin®rectal tube	1 rectal tube enthält 5mg Diazepam	Benzodiazepin	2	-	-	-	2
Euphyllong® i.v. 200	1 Ampulle zu 10ml enthält 200mg Theophyllin	Bronchospasmolytika	3	-	2	-	-
Fenistil®	1 Ampulle zu 4ml enthält 4mg Dimetidenmaleat	Antihistaminika	2	-	1	-	-
Fentanyl®-Janssen	1 Ampulle zu 10ml enthält 0,5mg Fentanyl	Opiat	2	-	1	-	-
Flumazenil	1 Ampulle zu 5ml enthält 0,5mg Flumazenil	Antidot vs. Benzodiazepin	-	-	-	2	-
Fortecortin® Inject 40mg	1 Ampulle zu 5ml enthält 40mg Dexamethason-21-dihydrogenphosphat	Glucocorticoid	2	-	1	-	-
Furosemid-ratiopharm®40mg	1 Ampulle zu 4ml enthält 40mg Furosemid	Diuretika	3	-	2	-	-
Gilurytmal® 50mg	1 Ampulle zu 10ml enthält 50mg Ajmalin	Antiarrhythmika	2	-	1	-	-
Glucose-Lösung 40%	1 Ampulle zu 10ml enthält 40g Glucose	Glucose	3	-	2	-	-
HAES-steril® 6% Volulyte - Beutel	1 Infusionslösung zu 500ml enthält 6% Hydroxyäthylstärke in 0,09% NaCl	Stärkederivat	3	-	-	-	-

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	RTW Schrank	NEF	Rucksack RTW/NEF	NEF Tox-Box	Kinder-rucksack
Heparin-Natrium 5000	1 Ampulle zu 1 ml enthält 0,5mg Heparin	Antikoagulanz	2	-	1	-	-
Hypnomidate®	1 Ampulle zu 10ml enthält 20mg Etomidat	Hypnotika	2	-	2	-	-
Jonosteril®	1 Infusionslösung zu 500ml enthält Natriumchlorid, Natriumacetat, Kaliumacetat, Magnesiumacetat	Vollelektrolytlösung	5	-	1	-	-
Ketanest® S	1 Ampulle zu 2ml enthält 50mg Esketamin	Narko-Analgetikum	4	-	2	-	-
Lidocain-HCl B.Braun 2%	1 Ampulle zu 5ml enthält 20mg LidocainHCl 1 H <sub>2</sub> O	Lokalanästhetikum zur intraossären Punktion	2	-	2	-	-
Lopresor® i.v. 5mg	1 Ampulle zu 5ml enthält 5mg Metoprololtartrat	β-Blocker	2	-	2	-	-
Lysthenon® siccum Pulver und Lösungsmittel	1 Inj.-Flasche enthält 500mg Suxamethoniumchlorid als Pulver	Muskelrelaxanz	1	-	1	-	-
Metalyse®	1 Durchstechflasche enthält 10.000 U (50mg) Tenecteplase	Fibrinolytika	-	1	-	-	-
Midazolam ratiopharm®	1 Ampulle zu 3ml enthält 15mg Midazolam	Benzodiazepin	2	-	1	-	-
Midazolam-ratioharm® 2mg/ml Lösung	1 ml enthält 2mg Midazolam	Benzodiazepin	-	1	-	-	-
Morphin	1 Ampulle zu 1ml enthält 10mg Morphinsulfat	Analgetika, Opiat	2	-	1	-	-
Naloxon Inresa 0,4mg	1 Ampulle zu 1ml enthält 0,4mg Naloxon-HCl	Antidot	-	-	-	2	-

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	RTW Schrank	NEF	Rucksack RTW/NEF	NEF Tox-Box	Kinder-rucksack
Natriumchlorid-Lösung 0,9%	1 Ampulle zu 10ml enthält 0,09g isotoner NaCl-Lösung	Elektrolytlösung	6	-	4	-	-
Natriumchlorid-Lösung 0,9%	1 Ampulle zu 50ml enthält 0,9g isotoner NaCl-Lösung	Elektrolytlösung	2	-	1	-	-
Natriumhydrogencarbonat 8,4%	1 Flasche zu 100ml enthält 8,4% Natriumhydrogencarbonat	Elektrolytkonzentrat	1	-	-	-	-
Nitrolingual®-Pumpspray	1 Sprühstoß enthält 0,4mg Glyceroltrinitrat	Nitrat	1	-	1	-	-
Novaminsulfon-ratiopharm®	1 Ampulle zu 5ml enthält 2,5g Metamizol-Natrium	Nicht-opioides Analgetika	2	-	1	-	-
Paracetamol-ratiopharm®	1 Zäpfchen enthält 250mg Paracetamol	Analgetika	2 kühl lagern	-	-	-	2 kühl lagern
Partusisten®	1 Ampulle zu 10ml enthält 0,5mg Fenoterolhydrobromid	Antiabortiva	-	-	-	1	-
Plavix® 300mg Filmtabletten	1 Tablette enthält 300mg Clopidogrel	Thrombozytenaggregationshemmer	4	4	-	-	-
Rectodelt® 100	1 Zäpfchen enthält 100mg Prednison	Corticoid	2 kühl lagern	-	-	-	2 kühl lagern
Risperidon-ratiopharm®	1 Schmelztablette enthält 2mg Risperidon	Psychopharmaka		2	-	-	-
Sab Simplex®	30ml Suspension enthalten 69,19 mg/ml Simecicon	Antidot vs. Waschmittel und Schaumbildner	-	-	-	1	-
Salbutamol-ratiopharm® Fertiginhalat	2,5 ml Fertiginhalat, enthält 1,5 mg Salbutamolsulfat	β <sub>2</sub> -Sympathomimetika	2	-	2	-	2

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	RTW Schrank	NEF	Rucksack RTW/NEF	NEF Tox-Box	Kinder-rucksack
Suprarenin®	1 Flasche zu 25ml enthält 25mg Epinephrin-HCl (1:1.000)	Katecholamin	2 kühl lagern	-	1 kühl lagern	-	-
Syntocinon® 10 I.E.	1 Ampulle zu 1ml enthält 10 I.E. Oxytocin	Hormon bei atonischer postpartaler Blutung	-	-	-	1	-
Thiopental Inresa <small>Trockensubstanz</small>	1 Durchstechflasche zu 20ml enthält 0,5g Thiopental-Natrium Trockensubstanz	Barbiturat	1	-	1	-	-
Toluidinblau	1 Ampulle zu 10ml enthält 300mg Toloniumchlorid	Antidot vs MetHb-Bildner	-	-	-	2	-
Toxogonin®	1 Ampulle zu 1ml enthält 250mg Obidoximchlorid	Antidot vs. Insektizide, Organophosphate z.B. E 605	-	-	-	2	-
Urapidil	1 Ampulle zu 10ml enthält 50mg Urapidil	Antihypertonika	1	-	1	-	-
Vomex A® Injektionslösung	1 Ampulle zu 10ml enthält 62mg Dimenhydrinat	Antihistaminika	1	-	1	-	-

#### Intoxikations-Kit

Präparat	Zusammensetzung	Gruppe	NEF Tox-Box	Sonstiges
4-DMAP	1 Ampulle zu 5ml enthält 250mg 4-Dimethylaminophenol-HCl	Antidota	2	Inkl. Set mit Braunülen etc.
Natriumthiosulfat 10%	1 Flasche zu 100ml enthält 10g Natriumthiosulfat	Antidota	10	